

Die Käferfauna der Leiser Berge (Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Niederösterreich)

Von Franz J. LEGORSKY

Einleitung

Die Leiser Berge, im Weinviertel gelegen und größtenteils Landschaftsschutzgebiet, erstrecken sich nordöstlich von Ernstbrunn nach Osten hin bis Asparn an der Zaya. Der westliche Teil grenzt an den Ernstbrunner Wald. Die Orte Pyhra und Michelstetten begrenzen im Norden diesen Höhenzug, und die südliche Begrenzung verläuft von Niederleis nach Osten, etwa der Bahnlinie Ernstbrunn - Asparn an der Zaya folgend.

Die charakteristische Hügellandschaft des Weinviertels mit Felssteppen und Trockenwäldern, xerothermen Hängen nach Süden hin, hat eine Flächenausdehnung von etwa 4300 Hektar. Ein Mischwald aus Eichen-, Wildkirschen-, Fichten- und Föhrenbewuchs erstreckt sich im Norden. Auf dem Buschberg, der höchsten Erhebung (491m), steht nächst der mächtigen Flugleitstelle mit ihren Radarstationen die einzige bewirtschaftete Berghütte des Weinviertels. Auf dem Oberleiser Berg (457m) befindet sich eine Aussichtswarte. Ein Wildpark bei Dörfles mit Rot- und Schwarzwild, Steinböcken, Mufflons usw. wurde 1975 eröffnet.

Meine Erfahrungen und Aufzeichnungen stützen sich auf eine mehr als zehn Jahre währende Tätigkeit als Coleopterologe in diesem Gebiet. In Klement, einer kleinen Ortschaft nördlich von Ernstbrunn gelegen, bewohnte ich bis 1988 ein Haus. Im dazugehörigen zirka 1000m² großen Garten befand sich eine Scheune mit eingelagertem Brennholz, aus dem sich laufend Käfer entwickelten. Auch ein Teich gehörte zu diesem Grundstück, das von verschiedenen wildwachsenden Sträuchern nach außen hin begrenzt wurde. Die Mehrzahl der Belege stammen aus Klement und Umgebung, Dörfles, Pyhra, vom Buschberg und dem östlichen Ernstbrunner Wald.

Die folgende Auflistung meiner Ausbeuten, analog zu HORION's "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas", stützt sich auf die Daten meiner umfangreichen Kartei, wo jeder einzelne Fund nach Örtlichkeit, Datum und Begleitumständen vermerkt ist. Aus Platzgründen kann hier nur eine Auflistung der Artnamen erfolgen. Einzelfunde, bzw. Neufunde für die Fauna von Niederösterreich werden entsprechend kommentiert. Alle Käfer wurden, wenn nicht anders angegeben, von mir gefangen oder beobachtet. Mir ist bewußt, daß das Ergebnis dieser Auflistung nicht Anspruch auf Vollständigkeit haben kann, schließlich konnten einige Familien nicht berücksichtigt werden.

Für die wertvolle Hilfe bei der Determination möchte ich folgenden Herren meinen Dank aussprechen: Karl Baderle †, Wolfgang Barries, Dr. Peter Cate, Dr. Alexander Dostal, Carolus Holzschuh, Dr. Manfred Jäch, Erich Kirschenhofer, Prof. Dipl.-Ing. DDr. Karl Mandl †, Ing. Gottfried Novak, Johann Probst, Harald Schillhammer, Dipl.-Ing. Wolfgang Suppantitsch, Prof. Dr. Günther Wewalka und Wilhelm Zelenka.

CICINDELIDAE

Cicindela silvicola DEJ.
- *campestris* L.

CARABIDAE

Cychnus caraboides rostratus L.
Carabus coriaceus L.
- *violaceus* L.
- *granulatus* L.
- *cancellatus brevituberculatus* R.
- *cancellatus interior* SOC.
- *ulrichi* GERM.
- *scheidleri* PANZ.
- *nemorialis* MÜLL.
- *hortensis* L.
Calosoma inquisitor L.
Leistus rufomarginatus DFT.
- *ferrugineus* L.
Notiophilus aestuans MOTSCH. (*pusillus* WATERH.)
- *palustris* DFT.
- *rufipes* CURT.
- *biguttatus* FAB.
Elaphrus riparius L.
Loricera pilicornis FABR.
Dyschirius aeneus DEJ.
Asaphidion flavipes L.
Bembidion lampros HBST.
- *properans* STEPH.
- *dentellum* THUNB.
- *varium* OLIV.
- *nitidulum* MARSH.
- *femoratum* STRM.
- *illigeri* NETOL.
- *minium* FABR.
- *tenellum* ERICHS.
- *azureus* WAGN.
- *quadripustulatum* SERV.
- *articulatum* PANZ.
- *octomaculatum* GZE.
- *obtusum* SERV.
Trechus quadristriatus SCHRK.
Panagaeus bipustulatus F.
Chlaenius vestitus PAYK.
Badister bipustulatus F.
Licinus cassideus F.
 Leiser Berge, ?, leg. et det. Syrutschek.
Harpalus punctatulus DFT.
- *rufibarbis* FABR.
- *azureus* F.
- *puncticollis* PAYK.
- *signaticornis* DFT.
- *rufipes* DE GEER (*pubescens* MÜLL.)
- *griseus* PANZ.
- *zabroides* DEJ.
 Ernstbrunn Umg., VII, 1 Ex., det. Kirschenhofer,
 neu für NÖ!
- *aeneus* F.
- *distinguendus* DFT.
- *roubali* SCHAUB.

Harpalus atratus LATR.
- *progrediens* SCHAUB.
- *latus* L.
- *quadripunctatus* DEJ.
- *rubripes* DFT.
- *vernalis* DFT.
- *tardus* PANZ.
Stenolophus skrimshiranus STEPH.
- *mixtus* HBST.
Acupalpus meridianus L.
Anisodactylus binotatus F.
Amara similata GYLL.
- *ovatus* F.
- *montivaga* STRM.
 Klement Umg., VIII, leg. Baderle.
- *communis* PANZ.
- *lunicollis* SCHIÖDTE
- *curda* DEJ.
- *convexior* STEPH.
- *aenea* DEG.
- *familiaris* DFT.
- *bifrons* GYLL.
- *equestris* DFT.
Zabrus tenebrioides GZE.
Poecilus cupreus L.
- *versicolor* STURM (*coerulescens* L.)
- *sericeus* FISCHER (*marginalis* DEJ.)
Pterostichus melanarius ILL.
- *nigrita* F.
- *ovoideus* STRM.
- *melas* CREUTZ.
- *oblongopunctatus* F.
Abax parallelus DFT.
- *parallelepipedus* PILL. & MITTERP. (*ater* VILL.)
- *exaratus* DEJ.
- *ovalis* DUFTSCH.
- *carinatus porcatus* DFT.
Molops elatus F.
Calathus fuscipes GZE.
- *ambiguus* PAYK.
- *mollis erythroderus* GEMM. & HAROLD
Synuchus vivalis ILL. (*nivalis* PANZ.)
Agonum viduum PANZ.
- *dorsalis* PONTOPP.
- *assimilis* PAYKULL
Demetrias atricapillus L.
Dromius linearis OLIV.
- *notatus* STEPH.
Metabletus obscuroguttatus DFT.
Aptinus bombardae ILLIGER
Brachynus crepitans L.
- *explo dens* DFT.

DYTISCIDAE

Coelambus impressopunctatus SCHALL.
Rhantus pulverosus STEPH. (*punctatus* FOURC.)
Colymbetes fuscus L.
Acilus canaliculatus NICOL.
 Ernstbrunn im Fischteich, IX, leg. Wewalka.

Dytiscus marginalis L.

Klement, Gartenteich, IV, leg. Baderle

HYDROPHILIDAE

Cercylon lateralis MASH.

- *analisis* PAYK.

Cymbiodyta marginella F.

SILPHIDAE

Necrophorus fossor ERICHSON (*interruptus* STEPH.)

- *vespilloides* HBST.

- *vespillo* L.

Necrodes littoralis L.

Thanatophilus rugosus L.

Oeoeptoma thoracica L.

Xylodrepa quadripunctata L.

Silpha carinata HBST.

- *obscurata* L.

Phosphuga atrata L.

SCAPHIDIDAE

Scaphidium quadrimaculatum OL.

STAPHYLINIDAE

Phloeocharis subtilissima MANNH.

Anthobium rectangulum FAUVEL

Omalium rivulare PAYK.

Lathrimaeum atrocephalum GYLL.

Oxytelus rugosus F.

- *insecatus* GRAV.

- *inustus* GRAV.

- *sculpturatus* GRAV.

- *nitidulus* GRAV.

Platystethus alutaceus THOMSON

Oxyporus rufus L.

Stenus biguttatus L.

- *comma* LEC. (*bipunctata* ER.)

- *similis* HBST.

Paederus schönherri CZWAL.

- *litoralis* GRAV.

Stilicis orbiculatus PAYK.

Lathrobium elongatum L.

Othius punctulatus GOEZE

Philonthus politus L.

- *atratus* GRAV.

Platydracus stercorarius OL.

- *fulvipes* SCOP.

Ocyopus biharicus MÜLL.

- *tenebricosus* GRAV.

- *similis* F.

Staphylinus melanarius HEER

Ontholestes murinus L.

- *haroldi* EPPH.

Creophilus maxillosus L.

Tachyporus hypnorum F.

Tachyporus solutus ER.

Tachyporus obtusus L.

Tachinus fimetarius GRAV.

- *rufipes* DEG.

Gyrophæna joyioides WÜSTH.

Heterothrops praeivius ER.

Drusilla LACORD. (*Astilbus* STEPH.) *canaliculata* F.

Zyras humeralis GRAV.

HISTERIDAE

Saprinus lautus ER.

Hister cadaverinus HOFFM.

- *helluo* TRU.

- *purpurascens* MEN.

- *carbonarius* HOFFM.

LYCIDAE

Homaliscus fontisbellaquei GEOFFR.

CANTHARIDAE

Cantharis fusca L.

- *rustica* FAL.

- *obscura* L.

- *livida* L.

- *pellucida* F.

Rhagonycha fulva SCOP.

MALACHIDAE

Charopus concolor F.

Ebaeus flavicornis ER.

CLERIDAE

Tillus elongatus L.

Opilo mollis L.

Thanasimus formicarius L.

Pseudoclerops mutillarius F.

Trichodes apiarius L.

ELATERIDAE

Agrypnus murinus L.

Ampedus sanguineus L.

- *elongatulus* F.

- *nigerrimus* LAC.

Melanotus brunripes GERM.

Cidnopus pilosus LESKE

- *minutus* L.

- *parvulus* PANZ.

Hemicrepidius (Athous) niger L.

- *hirtus* HBST.

Athous haemorrhoidalis F.

- *vittatus* F.

- *bicolor* GOEZE

Corymbites aeneus L.

- *bipustulatus* L.

Prosternon tessellatum L.

Agriotes acuminatus STEPH.

- *ustulatus* SCHALL.

- *sputator* L.

- *obscurus* L.

- *pilosellus* SCHÖNH.

Dolopius marginatus L.

Adrastus rachifer FOUR.

Denticollis linearis L.

BUPRESTIDAE

- Anthaxia salicis* F.
- *nitidula* L.
- *quadripunctata* L.
- *godeti* KÜST.
- *similis* SA.
Chrysobothris affinis F.
Agrilus biguttatus F.
- *convexicollis* REDTB.
Klement Umg., VIII, leg. Baderle.
- *cyanescens* RATZ.
- *laticornis* ILL.
- *angustulus* ILL.
- *sulcicollis* LAC.
- *pratensis* RATZ.
- *derasofasciatus* LAC.
- *olivicolor* KIESW.
Trachys minutus L.

DERMESTIDAE

- Dermestes lardarius* L.
Attagenus pellio L.
Megatoma undata L.

NITIDULIDAE

- Brachypterolus pulicarius* L.
Carpophilus hemipterus L.
Soronia grisea L.
Pocadius ferrugineus F.
Cryptarcha strigata F.
Librodor quadriguttatus F.
Glischrochilus quadrisignatus SCY.
- *hortensis* FOURC.

CUCUJIDAE

- Uleiota planata* L.

MYCETOPHAGIDAE

- Litargus connexus* GOFF.
Mycetophagus quadripustulatus L.
Typhaea stercorea L.

COLYDIIDAE

- Cerylon histeroides* F.

COCCINELLIDAE

- Adonia variegata* GZE.
Semiadalia undecimnotata SCHNEID.
Aphidecta oblitterata L.
Adalia decempunctata L.
- *bipunctata* L.
Coccinella septempunctata L.
Thea vigintiduopunctata L.
Calvia quatuordecimguttata L.
Paramysia oblongoguttata L.
Anatis ocellata L.

BOSTRYCHIDAE

- Bostrychus capucinus* L.

ANOBIIDAE

- Ptilinus pectinicornis* L.

PTINIDAE

- Ptinus rufipes* OL.
- *fur* L.
- *latro* F.

OEDEMERIDAE

- Asclera coerulea* L.
Oncopera femorata F.
Onoedemera femorata SCOP.

PYTHIDAE

- Vincenzellus ruficollis* PANZ.

PYROCHROIDAE

- Pyrochroa coccinea* L.

ANTHIDIDAE

- Anthicus floralis* L.
- *antherinus* L.

ALLECULIDAE

- Prionychus ater* F.
Hymenalia rufipes F.
Isomira murina L.
Podonta nigrita F.

TENEBRIONIDAE

- Pedinus femoralis* L.
Crypticus quisquilius L.
Diaperis boleti L.
Tenebrio molitor L.
Cylindronotus aeneus SCOP.

SCARABAEIDAE

- Onthophagus ovatus* L.
- *verticicornis* LAICH.
- *coenobita* HBST.
Odontaeus armiger SCOP.
Heptaulacus porcellus FRIV.
Geotrupes stercorosus SCRIBA
Apodius rufipes L.
- *sticticus* PANZ.
- *distictus* MÜLL.
Trox scaber L.
Serica brunnea L.
Rhizotrogus aequinoctialis HBST.
Phyllopertha horticola L.
Valgus hemipterus L.
Cetonia aurata L.
Liocola lugubris HBST.
Klement Umg., VIII, leg. Baderle.
Potosia cuprea FAB.

LUCANIDAE

Lucanus cervus L.
Dorcus parallelipedus L.
Systemocerus caraboides L.

CERAMBYCIDAE

Prionus coriarius L.
Tetropium castaneum L.
- *fuscum* F.
Criocephalus rusticus L.
Cerambyx scopoli FUESSL.
Obrium brunneum F.
Rhagium sycophanta SCHRK.
- *inquisitor* L.
Stenocorus meridianus PANZ.
Acmaeops collaris L.
Cortodera femorata F.
Grammoptera ustulata SCHALL.
- *ruficornis* F.
- *variegata* GERM.
Alosterna tabacicolor DEG.
Leptura rufipes SCHALL.
- *sexguttata* FABR.
- *livida* FABR.
- *maculicornis* DEG.
- *rubra* L.
- *sanguinolenta* L.
Judolia cerambyciformis SCHRK.
- *erratica* DALM.
Strangalia quadrifasciata L.
- *maculata* PODA
- *aethiops* PODA
- *melanura* L.
- *nigra* L.
- *septemmaculata* F.
- *attenuata* L.
Callidium violaceum L.
Phymatodes testaceum L.
Pyrrhidium sanguineum L.
Hylotrupes bajulus L.
Clytus arietis L.
Plagionotus detritus L.
- *arcuatus* L.
Chlorophorus varius MÜLL.
- *figuratus* SCOP.
Anaglyptus mysticus L.
Dorcadion fulvum SCOP.
Liopus nebulosus L.
Agapanthia villosoviridescens DEG.
- *violacea* F.
Obera linearis L.
Phytoecia cylindrica L.
Tetrops praeusta L.
Molorchus minor L.
- *umbellatarum* SCHRK.

CHRYSOMELIDAE

Lema lichenis VOET
- *melanopa* L.

Crioceris quinquepunctata SCOP.
Lilioceris lili SCOP.
- *merdigera* L.
Labidostomis longimana L.
Clytra laeviuscula RA.
Gynandrophthalma cyanea F.
- *aurica* L.
- *affinis* ILL.
- *xanthaspis* GERM.
Cryptocephalus bipunctatus L.
- *sexpunctatus* L.
- *cordiger* L.
- *sericeus* L.
- *hypochoeiridis transiens* FRANZ
- *violaceus* LAICH.
- *moraei* L.
- *flavipes* F.
- *chrysopus* GMEL.
- *fulvus* GZE.
Leptinotarsa decemlineata SAY
Chrysomela coerulans SCRIBA
- *herbacea menthastri* SUFFR.
- *diversipes* BED. (*violacea* MÜLL.)
- *varians* SCHALL.
Dlochrysa fastuosa SCOP.
Gastroidea polygoni L.
- *viridula* DEG.
Melasoma populi L.
- *tremulae* F.
Entomoscelis adonidis PALL.
Galeruca tanacetii L.
Lochmaea crataegi FORST.
Luperus circumfusum MARSH.
- *flavipes* L.
Agelastica alni L.
Sermylassa halensis L.
Podagricca fuscicornis L.

BRUCHIDAE

Bruchus atomarius L.
- *affinis* FRÖL.
- *luteicornis* ILL.
- *venustus* FABR.
Urodon rufipes OL.
Klement Umg., VI, det. J. Strejcek.

CURCULIONIDAE

Lasiorrhynchites sericeus HBST.
- *cavifrons* GYLL.
Coenorrhinus tomentosus GYLL.
- *germanicus* HBST.
- *aequatus* L.
Rhynchites cupreus L.
- *aethiops* BACH
- *bacchus* L.
Byctiscus betulae L.
Deporaus betulae L.
Attelabus nitens SCOP.
Apoderus coryli L.

Apion onopordi KIRBY

- *pisi* F.
- *aestimatum* FAUST
- *fascetum* GYLL. (selten!)
- *punctirostre* GYLL.
- *pavidum* BERM.
- *simile* KIRBY
- *ervi* KIRBY
- *subulatum* KIRBY
- *cerdo* GERST.
- *ochropus* GERM.
- *apricans* HBST.

Otiorrhynchus ovatus L.

- *orbicularis* HBST.
- *ligustici* L.

Trachyphloeus angustisetulus HANSEN

Phyllobius oblongus L.

- *piri* L.
- *maculicornis* GERM.
- *argentatus* L.
- *betulae* F.

Polydrosus impar GOZ.

- *marginatus* STEPH.
- *pterygomalis* BOH.
- *undatus* F.
- *picus* F.

- *sericeus* SCHALL.

Liophloeus tessulatus MÜLL.

Eusomus ovolum GERM.

Sciaphilus asperatus BONSD.

Strophosomus melanogrammus FÖ.

- *capitatus* DEG.

Barynotus obscurus F.

Sitona tibialis HBST.

- *lineatus* L.
- *sulcifrons* THUNB.
- *flavescens* MARSH.
- *crinitus* HBST.
- *hispidulus* F.
- *cylindricollis* F.

Sitona inops GYLL.

- *ambiguus* GYLL.
- Tanymecus palliatus* F.
- Cleonus piger* SCOP.
- Anthonomus rubi* HBST.
- *pororum* L.
- Fuscipes rectirostris* L.
- Curculio venosus* GRAV.
- *villosus* F.
- *nucum* L.
- *glandium* MARSH.
- *crux* F.

Pissodes pini L.

Magdalis rufa GERM.

- *violacea* L.

Hylobius abietis L.

Liparus germanus L.

Minyops carinatus L.

Hypera pedestris PAYK.

Calandra granaria L.

Baris artemisiae HBST.

Rhononcus pericarpus L.

Ceuthorrhynchus contractus MARSH.

- *quadridens* PANZ.

- *assimilis* PAYK.

- *syrites* GERM.

Cidnorrhinus quadrimaculatus L.

Gymnetron antirrhini PAYK.

- *bipustulatus* ROSSI

Cionus alauda HBST.

- *scrophulariae* L.

- *hortulanus* GEOFFR.

SCOLYTIDAE

Scolytus rugulosus RATZ.

Leperisinus varius F.

Hylastes cunicularius ER.

Xylocleptes bispinus DFT.

Ips cembrae HEER

Xyleborus saxeseni RATZ.

Anschrift des Verfassers: Franz J. Legorsky,
Brunnweg 4/7,
A-1100 Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Legorsky Franz Johann

Artikel/Article: [Die Käferfauna der Leiser Berge \(Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Niederösterreich\). 75-80](#)