

greß im Jahre 1951 in den Niederlanden tagen werde. Anschließend fand ein großes Bankett in allen Sälen des Stockholmer „Stadhuset“ statt, das von der schwedischen Regierung zu Ehren der Kongreßteilnehmer gegeben wurde.

Vom 15. August an schlossen sich an die Veranstaltungen des Kongresses in Stockholm, in einer Art Ergänzungsprogramm, zahlreiche Exkursionen nach Lappland, Mittel- und Südschweden.

Ein *Colias* Hybride ex ovo. (*Colias hyale* L. ♂ × *Col. croceus* Fourc. ♀).

Von Hans Ryszka, Wien.

Unter Hybriden (Bastarde) versteht man Nachkommen, die aus der Kreuzung zweier Arten (Species) hervorgegangen sind. Wurden zur Bastardierung (Hybridation) Unterarten (Subspecies) verwendet, so heißen solche Nachkommen „Blendlinge“.

Bastardierungen sind nicht häufig, da die von Art zu Art sehr verschiedene Ausbildung der Kopulationsorgane ein Gelingen der geschlechtlichen Vereinigung verhindert, in der Regel auch dann, wenn beide Geschlechter zweier nah verwandter Arten zusammentreffen. Außerdem ergibt selbst eine gelungene Kopula nur in seltenen Fällen eine Nachkommenschaft.

Immerhin ist bei manchen Lepidopteren (Saturniden, SpHINGIDEN u. a.) die Zucht von Artbastarden gelungen.

Ganz wenig sind Bastardierungen von Tagfaltern bekannt geworden und diese sind meist in Gefangenschaft erzielt worden. Daß aber auch im Freiland solche Kreuzungen vorkommen können, beweist der Umstand, daß Hybriden gefangen wurden, bei denen aber natürlich nicht hundertprozentig das Geschlecht und die Artzugehörigkeit der Elterntiere festgestellt werden konnte.

Ein Massenaufreten von *C. electo* ssp. *croceus* Fourc. (ich verwende in der Folge den gebräuchlicheren und besser bekannten Namen *C. edusa* L.) Ende der zwanziger Jahre in der Wiener Gegend veranlaßte mich damals, umfangreiche Zuchten dieses schönen Falters durchzuführen. Alle diese Zuchten ergaben einen vollen Erfolg. Gekrönt wurde meine viele Mühe durch das Schlüpfen eines Gynanders (Halbseitenzwitter), bei dem die linke Seite weiblich, die rechte männlich war. Das Tier ging seinerzeit in den Besitz des Herrn Dr. PHILIPPS, Köln a. Rh., über.

Nach meiner Entlassung aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft war es unmöglich, in meine Vaterstadt Wien zurückzukehren. Ich wählte ein Ausweichquartier in Aubach bei Ried i. Innkr., Oberösterreich. Bei meinen Streifzügen durch Wiesen und Felder des gesegneten Innviertels sah ich *C. edusa* L. fliegen. Schnell entschloß ich mich, meine Züchtertätigkeit wieder aufzunehmen. Es gelang mir mit vieler Mühe, ein ♀ zu fangen, das in einem aus einem alten Zuckerkarton schnell zusammengebastelten Behälter zur Eierablage gegeben wurde. Die erhaltenen Eier schlüpften restlos und alle Raupen ergaben nach vier Wochen die Puppen. Am

27. Juli 1946 schlüpfen die ersten Weibchen. Da schon seit Tagen auf einem Bahndamm in nächster Nähe meiner Schlafstelle frische Männchen von *C. edusa* flogen und ich unbedingt weiterzüchten wollte, band ich eines der ♀ dort an ein Büschel von Luzernerklee aus, um eine Freilandkopula zu erreichen. Der Versuch gelang vollkommen. Schon nach ungefähr einer Minute wurde das ♀ von einem wild dahersegelnden ♂ kopuliert. Die Vereinigung dauerte von 16—17¹⁵ Uhr (Sommerzeit) also 75 Minuten.

Am 29. Juli schlüpfte um 16 Uhr wieder ein großes Weibchen. Der Tag war regnerisch, deshalb war es mit dem Ausbinden nichts. Der 30. Juli war sonnig, heiß und windig. Um 11 Uhr band ich das Tier an einer halbwegs windgeschützten Stelle am Bahndamm aus. Kaum war ich mit dem Befestigen fertig, kam ein ♂ von *Col. hyale* angetrudelt und stillte seinen Durst an den Blüten der Stauden, an dem das *edusa* ♀ angebunden war. Dieses kroch an dem Klee-stengel hinauf, in die Nähe des artfremden ♂. Sofort begann von diesem ein heftiges Liebeswerben, das zirka 10 Minuten dauerte. Klopfenden Herzens verfolgte ich dieses Liebesspiel. So sehr sich das ♀ auch „zierte“, erlag es doch um 11⁴⁵ dem stürmischen Liebhaber. Die Kopula dauerte bis 13⁰², also 77 Minuten.

Eine photographische Aufnahme der Vereinigung war leider nicht möglich. Bemerkte sei noch, daß das *edusa* ♀ durchaus nicht so gefesselt war, daß es wehrlos war. Es hatte immerhin eine gewisse Bewegungsfreiheit, da es an einem zirka einen Meter langen Seidenfaden befestigt war.

Am 4. August begann es mit der Eiablage, am 5. September verendete es. Vier Wochen hat es gelebt und alle anderen ♀♀, die ich zwecks Eiablage gefangen hielt, lange überlebt. Während dieser Zeit hat es weit über 400 Eier abgelegt. Zirka 80% davon waren taub. Ein Teil fiel tierischen Feinden zum Opfer. Eine kleine, grauweiß gesprenkelte Spinne war wie toll hinter den Eiern her und sog sie aus und feiste Larven der Florfliege taten sich gütlich an den Eiern. Einige Eier verfärbten sich, aber die Räumchen schlüpfen nicht. Im ganzen hatte ich 21 Räumchen am Futter (eingetopfter Wiesenklee). Sie waren äußerst empfindlich und ein Teil ging noch vor der ersten, ein anderer nach der dritten Häutung ein.

Neun Puppen erhielt ich, davon waren fünf nicht normal ausgebildet und ergaben keinen Falter.

Die frischgelegten Eier waren elfenbeinfarbig, wurden nach zwei Tagen rot, nach vier Tagen stahlblau und schlüpfen am fünften Tage nach der Ablage.

Die geschlüpfen Tierchen waren 1½ mm lang, bräunlichgrün, der Kopf dunkelbraun und glänzend. Nach vier Tagen erfolgte die erste Häutung. Nach dieser maßen die Tiere 4 mm, waren dunkel smaragdgrün, desgleichen der Kopf, der ganze Körper war mit feinsten helleren Härchen bedeckt. Nach weiteren fünf Tagen häuteten sich die Raupen zum zweiten Male. Sie waren nun 7½ mm lang, grün, fein behaart mit sichtbarer heller Seitenlinie. Die dritte Häutung erfolgte 15 Tage nach dem Schlüpfen, Länge 16 mm. Nach weiteren sechs Tagen häuteten sie sich zum vierten und letzten Male, Länge 22 mm. Die Verpuppung erfolgte 27 Tage nach dem Verlassen der Eihülle. Die erwachsenen Raupen waren 32—35 mm lang, dunkelgrün, auch Kopf und Beine und

fein behaart. Die Stigmen waren schwarz, die gelblichweiße Seitenlinie zeigte oberhalb der Stigmen zitronengelbe Flecken, die bei der Edusaraupe orange gefärbt sind. Acht Tage nach der Verpuppung schlüpfen die Falter.

Es ist begreiflich, daß auch die Puppen von mir auf das sorgsamste betreut wurden.

Ich folge nun meinen Aufzeichnungen:

7. September 1946, ein ♀ geschlüpft.

Vorderflügel: Länge 16 mm, Grundfarbe ein fahles Ockergelb, an der Wurzel schwarzgrau bestäubt, Mittelfleck schwarzgrau. Der Außenrand ein Drittel des Flügels breit, verzüngt sich gegen den Innenrand, ohne ihn ganz zu erreichen, schwarzgrau mit fünf Flecken von der Grundfarbe des Flügels, Fransen schwärzlichrosa.

Hinterflügel: Grundfarbe wie Vorderflügel, jedoch stark schwärzlich bestäubt, von der Wurzel ausgehend. Mittelfleck hellorange, im Außenrand hellere Partien angedeutet. Fransen wie beim Vorderflügel.

Unterseite des Vorderflügels grünlichocker, Mittelfleck gekornt, vom Innenrand aus drei schwarzgraue Submarginalflecke.

Unterseite des Hinterflügels grün, mit silberglänzendem Doppelfleck, angedeutete submarginale Fleckenreihe.

Der Kopf des Tieres ist schwärzlichrosa behaart, die Augen sind grün, Fühler schwärzlichrot mit heller ockergelber Kolbe; Palpen ockergelb, drittes Glied oberseits schwärzlichrot behaart. Thorax gelblichrot behaart, Abdomen grün beschuppt, Beine rosa. *Holotypus*.

8. September 1946, ein ♂ geschlüpft.

Vorderflügel: Länge 21 mm, Grundfarbe ein leuchtendes Schwefelgelb, schwarzer Mittelfleck, Außenrand schwarzgrau, erreicht den Innenrand, mit schwachen Spuren gelber Bestäubung am Apex. Fransen wie beim ♀.

Hinterflügel: Grundfarbe wie oben, dunkel bestäubt. Außenrand schmal von Adern gelb durchschnitten. Mittelfleck orange, Androkonien weißlichgelb.

Unterseite des Oberflügels grünlichgelb, Mittelfleck nicht gekornt, markante submarginale Fleckenreihe.

Unterseite des Unterflügels grünlichgelb, submarginale Fleckenreihe, Mittelfleck rosarot, dunkel umrandet.

Kopf, Augen, Antennen und Palpen wie beim ♀. *Allotypus*.

17. September 1946, ein ♂ geschlüpft.

Unterscheidet sich vom Allotypus dadurch, daß der Außenrand des Oberflügels am Apex vier gelbe Flecke zeigt, sehr großer, schwarzer Mittelfleck, auch auf der Unterseite des Oberflügels.

Die Androkonien nur schwach angedeutet, weißlichgelb. Vorderflügelänge 18 mm. *Paratypus*.

24. September 1946, ein ♂ geschlüpft.

Vorderflügelänge 23 mm, Androkonien kaum erkennbar, sonst alle Merkmale des ♂ vom 17. 9. *Paratypus*.

Die ganze Zucht ergab also 1 ♀ und 3 ♂♂. Auffallend ist die Kleinheit dieses Hybriden. Das Muttertier war ausnehmend groß (Vorderflügelänge 31 mm), auch das Vater-tier zeigte normale Größe.

Ich benenne diesen äußerst interessanten, bisher unbekanntesten Bastard als

Fa. hybr. *hyale-edusa* m.

Sämtliche Typen befinden sich in meiner Sammlung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft
Österreichischer Entomologen](#)

Jahr/Year: 1949

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Ryszka Hans

Artikel/Article: [Ein Colias Hybride ex ovo. \(Colias hyale L. ? x Col.
Croceus Fourc. /\). 5-7](#)